

Lift delle Cosce

Protocollo di consenso informato ad intervento di LIFTING DELLE COSCE

Lo scopo del seguente modulo di consenso è di fornire al paziente, in aggiunta al colloquio preoperatorio con il chirurgo, le informazioni riguardanti le caratteristiche ed i rischi connessi con all'intervento di LIFTING DELLE COSCE. La preghiamo pertanto di leggere attentamente quanto segue, di discutere con il chirurgo la spiegazione di ogni termine che non fosse chiaro e quindi di firmare questo documento come conferma di avere ben compreso le informazioni ricevute.

Una ridondanza o lassità cutanea della faccia interna delle cosce può essere corretta mediante un intervento chirurgico.

Tale intervento, detto lifting delle cosce, è volto alla asportazione della cute in eccesso in corrispondenza della regione interna delle cosce. E' necessario essere consapevoli che, in ogni caso, non è possibile restituire la tensione e la compattezza che i tessuti hanno di solito nella giovinezza.

All'intervento residuano cicatrici estese nel solco inguinale e nel solco gluteo, ordinariamente occultabili sotto un costume da bagno non troppo sgambato. Le cicatrici possono tuttavia, per effetto della forza di gravità, spostarsi al di sotto del solco, diventando quindi più visibili.

L'intervento viene necessariamente effettuato in anestesia generale, mentre i giorni di degenza (di solito 1-2), la frequenza delle medicazioni, l'epoca della rimozione dei punti, dipendono dal singolo caso clinico.

Il risultato è generalmente soddisfacente fin dai primi tempi, anche se si può rendere necessario un ritocco delle cicatrici.

PRIMA DELL'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE

- * Informare il chirurgo di qualsiasi eventuale trattamento con farmaci (soprattutto cortisonici, contraccettivi, antipertensivi, cardioattivi, anticoagulanti, ipoglicemizzanti, antibiotici, tranquillanti, sonniferi, ecc.)
- * sospendere l'assunzione di medicinali contenenti acido acetilsalicilico (es. Alka Seltzer, Ascriptin, Aspirina, Bufferin, Cemerit, Vivin C, ecc) o altri antinfiammatori non steroidei.
- * Se possibile, segnalare i periodi del ciclo mestruale.
- * Eliminare o ridurre il fumo almeno una settimana prima dell'intervento.
- * Segnalare immediatamente l'insorgenza di raffreddore, mal di gola, tosse, malattie della pelle.
- * Organizzare, per il periodo post-operatorio, la presenza di un accompagnatore/trice, che può essere utile, anche se non indispensabile.
- * Procurarsi una guaina elastica.

ALLA VIGILIA DELL'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE

- * Non assumere cibi né bevande, a partire dalla mezzanotte.
- * Praticare un accurato bagno di pulizia completo; rimuovere lo smalto dalle unghie delle mani e dei piedi; depilare il pube.

IL GIORNO DELL'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE

- * Mantenere rigorosamente il digiuno e indossare un indumento da notte completamente apribile sul davanti con maniche molto comode.

DOPO L'INTERVENTO DI LIFTING DELLE COSCE

- * Alla dimissione farsi accompagnare a casa in automobile.
- * Per almeno 7 giorni indossare la guaina elastica posta dal medico, senza mai toglierla. Non fumare, per evitare colpi di tosse con relativo dolore e possibili sanguinamenti.

- * E' consentita una cauta ripresa della attività sessuale non prima di tre settimane.
- * Per almeno 2 settimane non guidare l'automobile.
- * per almeno un mese non praticare sport né fare ginnastica.
- * E' possibile praticare una doccia di pulizia solo dopo la rimozione dei punti.
- * Per almeno un mese evitare l'esposizione diretta al sole o al calore intenso (es.sauna,lampade UVA)

Al minimo dubbio di un andamento anormale del periodo postoperatorio o per qualsiasi altro problema inerente l'intervento, consultate senza esitazione il Vostro Chirurgo

